Manejo Actual y Alternativas de Futuro en la Colangitis biliar Primaria

Raul Andrade

Colangitis biliar primaria: un cambio de nomenclatura

Position Paper

EASL | JOURNAL OF HEPATOLOGY

Changing nomenclature for PBC: From 'cirrhosis' to 'cholangitis'☆☆

Ulrich Beuers^{1,*}, M. Eric Gershwin², Robert G. Gish³, Pietro Invernizzi⁴, David E.J. Jones⁵, Keith Lindor⁶, Xiong Ma⁷, Ian R. Mackay⁸, Albert Parés⁹, Atsushi Tanaka¹⁰, John M. Vierling¹¹, Raoul Poupon¹²

Países del Norte
40.2/100,000

Países del Sur
1.91/100,000

Clinical Practice Guidelines

EASL | JOURNAL OF HEPATOLOGY

EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and management of patients with primary biliary cholangitis*

European Association for the Study of the Liver*

- EASL recommends that in adult patients with cholestasis and no likelihood of systemic disease, a diagnosis of PBC can be made based on elevated ALP and the presence of AMA at a titre >1:40 (III, 1).
- EASL recommends that in the correct context, a diagnosis of AMA negative PBC can be made in patients with cholestasis and specific ANA immunofluorescence (nuclear dots or perinuclear rims) or ELISA results (sp100, gp210) (III, 1).
- EASL recommends against liver biopsy for the diagnosis of PBC, unless PBC-specific antibodies are absent, co-existent AIH or NASH is suspected, or other (usually systemic) co-morbidities are present (III, 1).
- AMA reactivity alone is not sufficient to diagnose PBC. EASL recommends following-up patients with normal serum liver tests who are AMA positive with annual biochemical reassessment for the presence of liver disease (III, 1).

HEPATOLOGY

PRACTICE GUIDANCE | HEPATOLOGY, VOL. 0, NO. 0, 2018

Primary Biliary Cholangitis: 2018 Practice Guidance from the American Association for the Study of Liver Diseases

Keith D. Lindor,¹ Christopher L. Bowlus,² James Boyer,³ Cynthia Levy,⁴ and Marilyn Mayo⁵

Guidance Statements: Diagnosis

- The diagnosis of PBC can be established when two of the following three criteria are met:
 - Biochemical evidence of cholestasis based on ALP elevation.
 - Presence of AMA, or other PBC-specific auto-antibodies, including sp100 or gp210, if AMA is negative.
 - Histologic evidence of nonsuppurative destructive cholangitis and destruction of interlobular bile ducts.

Epidemiologia

Trivedi et al, *Gut* 2021;70(10):1989-2003; Lv et al. *J Gastroenterol Hepatol* 2021; 36(6):1423-1434.

Diagnóstico de la colangitis biliar primaria

Deben cumplirse dos de tres criterios:

FA anormalmente elevada

AMA > 1:40 o ANA sp100/gp210

Lesión histológica compatible

EASL Recomienda	Evidencia
7. En pacientes adultos con colestasis y sin probabilidad de enfermedad sistémica, el diagnóstico de CBP se puede hacer basándose en elevaciones de la fosfatasa alcalina y la presencia de AMA a títulos >1:40 .	III/1
8. En el contexto adecuado, el diagnóstico de CBP AMA(-) se puede hacer en pacientes con colestasis con ANA específicos por inmunofluorescencia (punteado nuclear o círculo perinuclear) o ELISA (sp100, gp210) .	III/1
9. EASL recomienda no hacer biopsia para el diagnóstico de CBP , a menos que estén ausentes los anticuerpos específicos, haya sospecha de NASH o hepatitis autoinmune, u otras comorbilidades (habitualmente sistémicas).	III/1
10. La reactividad de AMA sola no es suficiente para diagnosticar CBP. En los pacientes AMA (+) con bioquímica hepática normal EASL recomienda bioquímicas anuales para la reevaluación de enfermedad hepática.	III/1

Abreviaciones: AMA; anticuerpos antimitocondriales; ANA: anticuerpos antinucleares; FA: fosfatasas alcalinas

Historia Natural

Tratamiento de la CBP

- Tratamientos para frenar la progresión de la enfermedad:

- 1ª Línea: Ácido ursodeoxicólico (AUDC), bien tolerado, **base del tratam**
- 2ª línea: asociados al AUDC
- ✓ Ácido Obeticólico : **actualmente suspendida su autorización**
- ✓ Agonistas PPAR:

Fibratos (bezafibrato): no aprobado para esta indicación en ficha t

Seladelpar

Elafibranor

- Tratamientos sintomático: astenia y “niebla mental (no tratamiento actualmente)

-Prurito: Resincolestiramina, **rifampicin**, **antagonistas opiodes** antihistamínicos, agonistas PPAR

-En desarrollo ; inhibidores del transportador ileal de ácidos biliares (IBAT); linerixibat, volixibat, y maralixibat

Diagnóstico de CBP

Colestasis bioquímica

AMA y/ó anti-sp100/gp-210

Lesión biliar histológica

Tratamiento con AUCD

12 meses

Valoración de respuesta a UDCA

Selección de candidatos a terapias de segunda línea

Mecanismos de acción del AUDC en la CBP

Mecanismos de muerte celular apoptótica por AQDC y su prevención por AUDC

Efectos del AUDC en la expresión de transportadores y enzimas responsables de la depuración de ácidos bilares y bilirrubina

Efectos inhibitorios del AUDC en la respuesta inmune

Mecanismos de colerésis rica en bicarbonato inducida por el AUDC

Respuesta inadecuada al tratamiento con AUCD

El fracaso del tratamiento debe definirse en función de criterios de valoración sustitutos validados para tener en cuenta la lenta progresión de la enfermedad:

- **Pruebas hepáticas séricas estándar** bajo tratamiento como herramienta pronóstica simple y robusta.
- **Respuesta bioquímica al UDCA:** evaluada mediante definiciones cualitativas basadas en variables binarias discretas o sistemas de puntuación cuantitativos calculados a partir de parámetros continuos (Tabla 5).

Table 5. Assessing response to UDCA therapy in PBC.

Qualitative binary definitions	Time (months)	Treatment failure
Rochester [101]	6	ALP $\geq 2 \times$ ULN or Mayo score ≥ 4.5
Barcelona [62]	12	Decrease in ALP $\leq 40\%$ and ALP $\geq 1 \times$ ULN
Paris-I [63]	12	ALP $\geq 3 \times$ ULN or AST $\geq 2 \times$ ULN or bilirubin > 1 mg/dl
Rotterdam [102]	12	Bilirubin $\geq 1 \times$ ULN and/or albumin $< 1 \times$ ULN
Toronto [98]	24	ALP $> 1.67 \times$ ULN
Paris-II [104]	12	ALP $\geq 1.5 \times$ ULN or AST $\geq 1.5 \times$ ULN or bilirubin > 1 mg/dl
Ehime [103]	6	Decrease in GGT $\leq 70\%$ and GGT $\geq 1 \times$ ULN
Continuous scoring systems	Time (months)	Scoring parameters
UK-PBC [107]	12	Bilirubin, ALP and AST (or ALT) at 12 mo. Albumin and platelet count at baseline
GLOBE [106]	12	Bilirubin, ALP, albumin, and platelet count at 12 mo. Age at baseline

ALP, alkaline phosphatase; ULN, upper limit of normal; AST, aspartate aminotransferase; GGT, gamma-glutamyltransferase.

Respuesta inadecuada al tratamiento con AUCD

Las guías de EASL y AASLD recomiendan que la **respuesta bioquímica** debe evaluarse tras **1 año de tratamiento** con UDCA, utilizando las **herramientas de pronóstico**^{1,2}

De los pacientes con CBP presentan una respuesta inadecuada a UDCA^{3a}

De los pacientes con CBP presentan intolerancia a UDCA⁴

Factores de riesgo relacionados con la respuesta inadecuada a UDCA:

- Varones^{4,5}
- Pacientes más jóvenes <45 años edad al diagnóstico^{4,5}
- Enfermedad avanzada en el diagnóstico⁴

Síntomas digestivos: Nausea, diarrea, distensión o discomfort abdominal

Astenia, cefalea o prurito.

Alteraciones de la bioquímica hepática: ALT, AST o bilirrubina pueden elevarse tras iniciar UDCA, indicando intolerancia

1. EASL CPG on PBC J Hepatol 2017;67(1):145–172; 2. Lindor KD et al. Hepatology 2019;69(1):394–419; 3. Corpechot C et al. Hepatology 2008;48(3):871–877; 4. Invernizzi P et al. Dig Liver Dis 2017;49(8):841–846; 5. Carbone M et al. Gastroenterology 2013;144(3):560–569; 6. Trivedi PJ et al. Gut 2016;65(2):321–329; 7. Hirschfield G et al. Expert Rev Gastroenterol Hepatol 2021;15(8):929–939; 8. Zhang LN et al. Hepatology 2013;58(1):264–272; 9. Rudic JS et al. Cochrane Database Syst Rev 2012;12(12):CD000551.

Tratamiento con AUC de la PBC

El estudio **international PBC cohort study** demostró que el tratamiento con **UDCA** se asociaba a una **mayor supervivencia libre de trasplante**

- Cohorte internacional
- 3,902 pacientes con CBP (3,529 tratados; 373 no tratados)
- Mediana ([IQR]) seguimiento de 7.8 (4.1–12.1) años
- Objetivo final primario, **supervivencia libre de trasplante/muerte**

Transplant-free survival according to UDCA treatment

Loss of biochemical response at any time worsens outcomes in UDCA-treated patients with primary biliary cholangitis

Surain B. Roberts^{1,2,3}, Woo Jin Choi³, Lawrence Worobetz⁴, Catherine Vincent⁵, Jennifer A. Flemming⁶, Angela Cheung⁷, Karim Qumosani⁸, Mark Swain⁹, Dusanka Grbic¹⁰, Hin Hin Ko¹¹, Kevork M. Peltekian¹², Lusine Abrahamyan^{3,32}, Monika Saini¹, Kattleya Tirona¹, Bishoi Aziz¹³, Ellina Lytyyak¹³, Pietro Invernizzi^{14,33}, Cyriel Y. Ponsioen¹⁵, Tony Bruns¹⁶, Nora Cazzagon¹⁷, Keith Lindor¹⁸, George N. Dalekos¹⁹, Nikolaos K. Gatselis⁴⁰, Xavier Verheist²⁰, Annarosa Floreani^{17,39}, Christophe Corpechot²¹, Marilyn J. Mayo²², Cynthia Levy²³, Maria-Carlota Londoño²⁴, Pier M. Battezzati²⁵, Albert Pares²⁶, Frederik Nevens²⁷, Adriaan van der Meer²⁸, Kris V. Kowdley²⁹, Palak J. Trivedi^{30,36,37,38}, Ana Lleo³¹, Douglas Thorburn³², Marco Carbone^{14,33}, Nazia Selzner³⁴, Aliya F. Gulamhusein^{1,3}, Harry LA. Janssen^{1,28}, Aldo J. Montano-Loza¹³, Andrew L. Mason¹³, Gideon M. Hirschfield^{1,3,*,†}, Bettina E. Hansen^{1,3,35,*,†}, on behalf of the Canadian Network for Autoimmune Liver disease (CaNAL)

JHEP Reports 2024. vol. 6 | 1–10

La reevaluación continua de la respuesta bioquímica proporciona información clínicamente relevante sobre el perfil de riesgo variable, destacando las oportunidades de intervención para reducir el riesgo de LTx o muerte.

La pérdida de respuesta bioquímica en cualquier momento se asocia a un mayor riesgo de LTx o muerte.

Objetivo: lograr una respuesta bioquímica durante todo el seguimiento, independientemente del perfil de respuesta inicial a la terapia

UDCA-treated patients with Primary Biliary Cholangitis have worse outcomes after losing biochemical response at any time

Las guías clínicas EASL (European Association for the Study of the Liver) establecen que el tratamiento de la CBP debe **prevenir las complicaciones de la enfermedad hepática terminal** y **controlar los síntomas**

**Nota: La EMA ha revocado la autorización de comercialización de OCA*

Nuevas opciones de 2ª línea para el tratamiento de la CBP

Los PPARs son un grupo de factores de transcripción activados por ligandos que existen como isoformas α , δ y γ ¹

Agonistas sintéticos de la PPAR para el tratamiento de la CBP

La activación de los PPARs por agonistas selectivos orales promueve la transactivación ligando-dependiente de un rango de genes que regulan la homeostasis energética, el metabolismo de lípidos y los procesos inmunes e inflamatorios¹

No Fibratos^a

En RCT fase III:

- **Saroglitazar:** agonista dual PPAR α & PPAR γ ^{7,8}

Aprobado en US, EU y UK:

- **Elafibranor:** agonista PPAR, actúa sobre PPAR α & PPAR δ ⁹⁻¹¹

Aprobado en US y EU

- **Seladelpar:** agonista PPAR δ ¹²

Adapted from Kytikova OY et al. 2020²

PBC: primary biliary cholangitis; PPAR: peroxisome proliferator-activated receptor. 1. Decara J et al. Front Pharmacol 2020;11:730; 2. Kytikova OY et al. PPAR Research 2020;2020:8906968; 3. EASL Collaborators. J Hepatol 2017;67(1):145–172; 4. Chascsa D & Lindor K. J Gastroenterol 2020;55:262–272; 5. Levy C et al. Aliment Pharmacol Ther 2011;33(2):235–242; 6. Corpechot C et al. N Engl J Med 2018;378(23):2171–2181; 7. Vuppalanchi R et al. J Hepatol 2022;76(1):75–85; 8. ClinicalTrials.gov. [NCT05133336](https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT05133336); 9. FDA Prescribing Information; 10. EMA Elafibranor SmPC; 11. GOV.UK Press Release. Available at: <https://www.gov.uk/government/news/elafibranor-approved-as-first-medicine-to-treat-adults-with-a-rare-liver-disease-known-as-primary-biliary-cholangitis>; 12. FDA Prescribing Information.

Ensayo Clínico ELATIVE: elafibranor vs placebo

Diseño del estudio^{1,2}

Al final del periodo doble ciego de ELATIVE®, los pacientes podían entrar en una extensión abierta y recibir elafibranor durante un máximo de 5 años adicionales^{1,2}

1. Kowdley KV et al. New Engl J Med 2024;390(9):795–805; 2. Kowdley KV et al. New Engl J Med 2024;390(9):795–805. (Suppl.).

Respuesta bioquímica a las 52 semanas: objetivos primario y secundario

Biochemical Response

Normalization of Alkaline Phosphatase

Beneficio del tratamiento: 47%
(IC95%= 32-57)

Ensayo clínico RESPONSE: seladelpar vs. placebo

Diseño del estudio¹⁻³

1. ClinicalTrials.gov. [NCT04620733](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04620733); 2. ClinicalTrials.gov. [NCT03301506](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03301506); 3. Hirschfield GM et al. N Engl J Med 2024;390(9):783-794; 4. Hirschfield GM et al. N Engl J Med 2024;390(9):783-794. (Suppl.).

Respuesta bioquímica a 52s: objetivo primario y secundarios

Efectos adversos:

Elafibranor¹

Table 3. Summary of Adverse Events and Adverse Events Occurring in More than 10% of Patients in Either Group.

Event	Elafibranor (N = 108)	Placebo (N = 53)
	<i>no. of patients (%)</i>	
Any adverse event that emerged during treatment period*	104 (96)	48 (91)
Covid-19	31 (29)	20 (38)
Pruritus	22 (20)	14 (26)
Abnormal weight gain	21 (19)	10 (19)
Abdominal pain, including upper and lower abdomen	12 (11)	3 (6)
Diarrhea	12 (11)	5 (9)
Nausea	12 (11)	3 (6)
Urinary tract infection	12 (11)	10 (19)
Vomiting	12 (11)	1 (2)
Fatigue	10 (9)	7 (13)
Headache	9 (8)	6 (11)
Back pain	4 (4)	6 (11)
Any severe adverse event†	12 (11)	6 (11)
Any adverse event attributed to the trial regimen that emerged during treatment period‡	42 (39)	21 (40)
Any serious adverse event that emerged during treatment period§	11 (10)	7 (13)
Any adverse event leading to discontinuation of the trial regimen that emerged during treatment period	11 (10)	5 (9)
Any fatal adverse event	2 (2)	0

Seladelpar²

Table 2. Adverse Events and Serious Adverse Events.*

Event	Placebo (N = 65)	Seladelpar (N = 128)
	<i>number (percent)</i>	
Any adverse event	55 (84.6)	111 (86.7)
Any serious adverse event	4 (6.2)	9 (7.0)
Adverse events in ≥5% of patients		
Coronavirus disease 2019	10 (15.4)	23 (18.0)
Pruritus	10 (15.4)	6 (4.7)
Upper respiratory tract infection	6 (9.2)	1 (0.8)
Headache	2 (3.1)	10 (7.8)
Nasopharyngitis	5 (7.7)	7 (5.5)
Pharyngitis	5 (7.7)	4 (3.1)
Abdominal pain	1 (1.5)	9 (7.0)
Arthralgia	4 (6.2)	8 (6.2)
Fatigue	4 (6.2)	8 (6.2)
Nausea	3 (4.6)	8 (6.2)
Abdominal distention	2 (3.1)	8 (6.2)
Asthenia	4 (6.2)	5 (3.9)
Urinary tract infection	4 (6.2)	4 (3.1)
Hypertension	4 (6.2)	4 (3.1)
Positional vertigo	4 (6.2)	1 (0.8)

¹Kowdley KV et al. New Engl J Med 2024;390(9):795–805.; ²Hirschfield GM et al. N Engl J Med 2024;390(9):783–794

Necesidades no cubiertas en CBP

Evaluación temprana de la respuesta al tratamiento

La **identificación precoz** de los pacientes para el tratamiento de segunda línea podría **reducir el riesgo de progresión de la enfermedad**^{5,6}

Normalización de los parámetros clínicos

Los objetivos del tratamiento en CBP varían, pero los objetivos del tratamiento deben hacer hincapié en la **normalización de marcadores surrogados** como la bilirrubina y la ALP⁷

Tratamiento óptimo del impacto de los síntomas

Algunos tratamientos, como el UDCA, **no son eficaces** en algunos pacientes^{1,2}, lo que aumenta el riesgo de cirrosis, trasplante de hígado o muerte¹.

No existe un tratamiento eficaz para la **fatiga, el deterioro cognitivo o el prurito**, que repercuten en la CdV^{1,3,4}

Gaps en el tratamiento

Las opciones terapéuticas son **limitadas** y, dado que el UDCA no es eficaz en algunos pacientes, es necesario seguir desarrollando **terapias alternativas o de segunda línea**^{1,3}.

Los tratamientos **no son curativos** y tratan en gran medida las manifestaciones secundarias de la CBP¹.

Un enfoque personalizado al cuidado del paciente

¡GRACIAS!